







ソラマメは世界最古の農作物の一つ、原産地は北アフリカからカスピ海沿岸といわれますが、諸説あります。

若いさやが空に向かって実るので「空豆」、豆の形が蚕が作る繭に似ているところから「蚕豆」とも呼ばれています。

近頃は年末から出回り始めますが、本来は初夏を代表する味覚品です。

タンパク質、糖質、ビタミン類やミネラルが多く含まれ栄養豊かですが、収穫後の糖含量の減少は極めて早く、食味がやすいので、



適期を見届けて収穫し、できるだけ早く食べたい作物。育て方もやさしいので、家庭菜園にはぜひ取り入れたい作物です。

育て方のポイントは適期まきを守り、アブラムシの防除対策を怠らないことです。

種のまきどきは10月中旬〜下旬ですが、寒冷地では早くまき過ぎると冬までに大きく育ち過ぎ、寒害を受けやすくなるので、それよりもやや遅まきに、温暖地ではやや早まきにすることが大切です。

品種は大粒で食味が良く、3粒入り率の高い品種を選びます。

ソラマメの種子は作物の中では一番大きく、発芽には水分と酸素を多く必要とします。よく発芽させるには深くまき過ぎないこと。お歯黒を斜め下方に向けて土に差し込むようにし、芽が地上に出やすくすることが大切です(図1)。

近年アブラムシからの感染によるウイルス病の被害が大変多く見られるようになってきているので、種まき後、畝全面を黒色ポリフィルムでマルチングし、飛来を回避するよう努めましょう(図2)。生育初期や春になって茎葉が旺盛に繁茂する頃、アブラムシが大発生しやすいので、早めに薬剤散布します。

ソラマメの実の付き具合をよく見ると、下方から数えて5〜8節でよく実止まりし、その上方の物は実止まりしないのが一般的なので、上方の茎葉は不要ですから、実太りを見届けてから刈り取ってしまうことができます。刈り取ることににより茎葉倒伏を防ぐこともできるので、一挙両得です(図3)。

収穫の適期は、さやの中の実が大きく膨らみ、実を見るとお歯黒が色づいている状態のときです。

## 肥料・農薬のご紹介

### 秋冬野菜の害虫駆除に「プレオフロアブル」



アブラナ科野菜(キャベツ・白菜等)の栽培時によく発生する害虫がコナガ(蛾の幼虫)・ハスモンヨトウ(チョウ目)などです。これらの害虫を放置していると、葉を食害し、野菜の生長を阻害する原因となります。

そんな時に、オススメの殺虫剤がプレオフロアブルです! プレオは葉に付着する幼虫に対して高い殺虫効果とすぐれた残効性で、作物を害虫から守ります。

また、ユリ科野菜(ネギ・玉ねぎ)やナス科野菜(ナス・トマト)にもハスモンヨトウの適用があるため、使いやすい殺虫剤です。

秋冬野菜の害虫にお困りの方はぜひ、プレオフロアブルをご使用ください!

※お気軽に各営農センター(営農購買課)へお問い合わせください。